

TABLEAU R1 DÉTAILLÉ - ESTRIE  
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ÉTAT DE SANTÉ MENTALE

INDICATEURS*		ESTRIE	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
					MIN	MAX		
Proportion de la population ayant vécu un épisode dépressif majeur, en %, 2005		4,2	4,7	5 sur 15	3,6	7,2	3,7	87,3 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles mentaux, pour 1 000 habitants, 2009-2010		128,1	115,1	15 sur 15	89,6	128,1	100,9	78,8 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles anxio-dépressifs, pour 1 000 habitants, 2009-2010		76,9	73,6	13 sur 15	56,2	79,8	61,5	80,0 %
Prévalence annuelle ajustée des troubles de schizophrénie, pour 1 000 habitants, 2009-2010	Prévalence des troubles mentaux	8,4	4,3	15 sur 15	2,4	8,4	2,5	29,8 %
Proportion des personnes considérant leur santé mentale comme très bonne ou excellente, en %, 2010		77,1	75,8	6 sur 15	69,9	81,3	80,6	95,7 %
Proportion de la population ayant reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie, en %, 2009-2010		5,0	4,9	9 sur 15	3,2	6,6	3,5	70,7 %
Taux ajusté d'hospitalisation liée à la maladie mentale, pour 100 000 habitants, 2009-2010		563	429	8 sur 15	256	768	293	52,0 %
Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation matérielle, en %, 2009	Déterminants non médicaux et facteurs de protection	44,9	39,6	8 sur 15	21,8	92,2	25,5	56,8 %
Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation sociale, en %, 2009		40,7	40,1	13 sur 15	9,3	62,1	21,8	53,6 %
Proportion de la population considérant son sentiment d'appartenance à la communauté locale comme plutôt fort ou très fort, en %, 2010		56,0	56,9	11 sur 15	47,5	81,2	76,1	73,6 %
Proportion des travailleurs ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi, en %, 2005		20,1	21,7	5 sur 15	15,5	26,5	17,6	87,4 %
Proportion de la population percevant sa vie comme stressante ou extrêmement stressante, en %, 2010		19,4	26,7	1 sur 15	19,4	31,3	20,1	100,0 %
Proportion de la population ayant consommé de la drogue, en %, 2008		13,6	13,1	11 sur 15	9,5	15,4	10,3	76,0 %
Taux de consommation abusive d'alcool, en %, 2010		18,0	17,7	7 sur 15	12,4	30,8	13,2	73,5 %
Proportion de la population satisfaite ou très satisfaite à l'égard de la vie, en %, 2010		92,6	93,9	12 sur 15	91,5	96,8	96,1	96,4 %
Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique, en %, 2007-2008		18,2	20,0	6 sur 15	14,2	23,8	16,0	88,1 %
Proportion de la population ayant songé au suicide, en %, 2008		2,9	2,8	9 sur 15	2,0	3,4	2,3	78,2 %
Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants, 2005-2007	Efficacité	17,8	15,3	9 sur 15	10,7	24,3	11,9	66,7 %
Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans, 2005-2007		595	495	10 sur 15	309	826	370	62,2 %
Taux ajusté d'hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée, pour 100 000 habitants, 2009-2010		74	61	8 sur 15	27	157	57	77,0 %

\* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être ([www.csbe.gouv.qc.ca](http://www.csbe.gouv.qc.ca)).

\*\* Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

\*\*\* La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

## TABLEAU R2 DÉTAILLÉ - ESTRIE TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ADAPTATION

INDICATEURS*		ESTRIE	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
					MIN	MAX		
Dépenses pour le programme de santé mentale par habitant, en \$, 2009-2010		120	137	8 sur 15	68	211	193	62,1 %
Dépenses consacrées aux organismes communautaires, en % du total des dépenses pour le programme de santé mentale, 2009-2010	Capacités financières	6,1	8,8	14 sur 15	5,5	14,5	13,6	44,7 %
Dépenses pour le programme de santé mentale, en % du total des dépenses pour l'ensemble des programmes-services, 2009-2010		6,5	8,0	13 sur 15	5,4	9,3	9,1	71,5 %
Nombre de psychiatres (rémunérés à l'acte, en ETC), pour 100 000 habitants, 2009		11,9	12,7	5 sur 15	3,8	19,3	18,4	64,5 %
Nombre de psychologues, pour 100 000 habitants, 2010-2011		119,7	107,8	3 sur 15	53,8	165,6	145,8	82,1 %
Nombre d'intervenants de première ligne dans les équipes de santé mentale en CSSS (en ETC), pour 100 000 habitants, 2009-2010		22,0	13,8	2 sur 15	8,6	25,4	22,9	96,3 %
Nombre d'infirmières pratiquant dans le secteur de la santé mentale, pour 100 000 habitants, 2010-2011		57,7	52,5	3 sur 15	18,2	95,5	77,2	74,8 %
Nombre de places destinées aux adultes ayant un diagnostic psychiatrique, au sein des CHSLD publics et privés conventionnés, pour 100 000 habitants, 2009-2010	Capacités humaines et matérielles	19,6	9,2	2 sur 15	0,0	37,9	23,3	84,0 %
Nombre de places au sein des ressources intermédiaires destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010		23,2	34,2	8 sur 15	4,1	68,6	35,2	65,8 %
Nombre de places au sein des ressources de type familial destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010		60,4	46,4	5 sur 15	7,4	100,9	60,4	100,0 %
Nombre de places en soutien d'intensité variable dans la communauté, pour 100 000 habitants, 2009-2010		86,3	74,3	8 sur 15	24,3	205,0	102,6	84,1 %
Nombre de places en suivi intensif dans le milieu, pour 100 000 habitants, 2009-2010		4,6	24,9	11 sur 15	0,0	81,5	34,7	13,2 %
Proportion des interventions en santé mentale, en % du total des interventions en CLSC, 2010-2011		7,8	6,2	-	3,0	11,4	-	-
Taux de rétention de la clientèle pour les hospitalisations en psychiatrie, en %, 2009-2010	Ajustement aux besoins de la population	95,6	-	7 sur 15	50,8	98,6	98,3	97,2%
Indice d'autosuffisance en psychiatrie, 2009		1,0	1,0	3 sur 15	0,3	1,3	1,1	91,2 %

\* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être ([www.csbe.gouv.qc.ca](http://www.csbe.gouv.qc.ca)).

\*\* Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

\*\*\* La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - ESTRIE  
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION

INDICATEURS*	ESTRIE	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population ayant utilisé au moins une ressource à des fins de santé mentale, en %, 2003	8,4	7,5	2 sur 15	4,9	8,7	8,5	98,8 %
Proportion de la population ayant consulté un psychologue au sujet de sa santé mentale, en %, 2003	4,3	3,8	3 sur 15	2,0	4,8	4,6	93,5 %
Proportion de la population ayant vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de sa santé mentale, en %, 2003-2004	9,2	8,1	2 sur 15	5,3	9,4	9,3	99,3 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	3,2	3,3	6 sur 15	2,3	5,8	2,6	82,5 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	10,3	9,6	8 sur 15	6,4	19,2	7,3	70,9 %
Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	76,2	73,2	5 sur 15	59,9	78,3	77,0	99,0 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	4,5	4,1	7 sur 15	3,1	7,3	3,4	75,0 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	12,0	10,3	10 sur 15	7,5	23,8	8,6	71,7 %
Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	81,7	79,3	5 sur 15	64,9	83,4	82,9	98,4 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009	20,0	27,2	1 sur 15	20,0	45,0	25,8	100,0 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009	10,5	12,0	3 sur 15	7,1	16,9	9,3	87,8 %
Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009	69,1	55,5	1 sur 15	40,3	69,1	60,8	100,0 %

Accessibilité

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - ESTRIE  
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION (SUITE)

INDICATEURS*	ESTRIE	ENSEMBLE DU QUÉBEC	RANG**	ÉTENDUE		BALISE***	% D'ATTEINTE DE LA BALISE
				MIN	MAX		
Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antidépresseurs, en %, 2009	16,1	14,4	8 sur 15	11,4	18,2	17,9	89,9 %
Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antipsychotiques, en %, 2006	5,1	4,4	4 sur 15	3,3	5,3	5,2	98,3 %
Proportion d'usagers dont le délai d'accès aux services de deuxième ou de troisième ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours, en %, 2009-2010	4,7	4,0	12 sur 15	0,3	15,7	2,1	44,9 %
Délai moyen d'attente de l'utilisateur pour une première intervention (évaluation ou action) en santé mentale, en jours, 2010-2011	31,4	36,0	4 sur 15	14,2	55,1	32,8	100,0 %
Proportion des séjours de 12 heures et plus sur civière à l'urgence pour des raisons de santé mentale, en %, 2010-2011	61,0	52,8	13 sur 15	19,0	72,4	36,8	60,3 %
Usagers de moins de 18 ans ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010	1,2	0,5	3 sur 15	0,2	2,9	1,1	100,0 %
Usagers de 18 ans et plus ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010	1,1	0,4	1 sur 15	0,1	1,1	0,9	100,0 %
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux généraux, en jours, 2009-2010	24,0	23,8	10 sur 15	14,2	36,3	15,8	65,8 %
Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, en jours, 2009-2010	-	51,9	-	22,9	76,7	-	-
Nombre d'interventions par usager des services de santé mentale en CLSC, 2010-2011	10,0	9,2	4 sur 15	5,9	15,0	14,5	68,8 %
Proportion des patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, en %, 2008-2009	10,4	10,2	8 sur 15	6,5	13,4	7,6	73,1 %
Taux de réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale, en %, 2010-2011	13,4	11,2	13 sur 15	7,9	13,5	8,4	62,7 %

\* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être ([www.csbe.gouv.qc.ca](http://www.csbe.gouv.qc.ca)).

\*\* Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

\*\*\* La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.