

TABLEAU R1 DÉTAILLÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ÉTAT DE SANTÉ MENTALE

| INDICATEURS* | | CHAUDIÈRE-APPALACHES | ENSEMBLE DU QUÉBEC | RANG** | ÉTENDUE | | BALISE*** | % D'ATTEINTE DE LA BALISE |
|---|---|----------------------|--------------------|-----------|---------|-------|-----------|---------------------------|
| | | | | | MIN | MAX | | |
| Proportion de la population ayant vécu un épisode dépressif majeur, en %, 2005 | | 3,8 | 4,7 | 3 sur 15 | 3,6 | 7,2 | 3,7 | 96,5 % |
| Prévalence annuelle ajustée des troubles mentaux, pour 1 000 habitants, 2009-2010 | | 112,9 | 115,1 | 6 sur 15 | 89,6 | 128,1 | 100,9 | 89,4 % |
| Prévalence annuelle ajustée des troubles anxio-dépressifs, pour 1 000 habitants, 2009-2010 | | 70,1 | 73,6 | 5 sur 15 | 56,2 | 79,8 | 61,5 | 87,7 % |
| Prévalence annuelle ajustée des troubles de schizophrénie, pour 1 000 habitants, 2009-2010 | Prévalence des troubles mentaux | 3,4 | 4,3 | 5 sur 15 | 2,4 | 8,4 | 2,5 | 73,5 % |
| Proportion des personnes considérant leur santé mentale comme très bonne ou excellente, en %, 2010 | | 75,7 | 75,8 | 9 sur 15 | 69,9 | 81,3 | 80,6 | 93,9 % |
| Proportion de la population ayant reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie, en %, 2009-2010 | | 3,2 | 4,9 | 1 sur 15 | 3,2 | 6,6 | 3,5 | 100,0 % |
| Taux ajusté d'hospitalisation liée à la maladie mentale, pour 100 000 habitants, 2009-2010 | | 657 | 429 | 10 sur 15 | 256 | 768 | 293 | 44,5 % |
| | | | | | | | | |
| Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation matérielle, en %, 2009 | Déterminants non médicaux et facteurs de protection | 43,2 | 39,6 | 7 sur 15 | 21,8 | 92,2 | 25,5 | 59,1 % |
| Proportion de la population se trouvant dans les 4e et 5e quintiles de défavorisation sociale, en %, 2009 | | 22,1 | 40,1 | 3 sur 15 | 9,3 | 62,1 | 21,8 | 99,0 % |
| Proportion de la population considérant son sentiment d'appartenance à la communauté locale comme plutôt fort ou très fort, en %, 2010 | | 56,2 | 56,9 | 10 sur 15 | 47,5 | 81,2 | 76,1 | 73,9 % |
| Proportion des travailleurs ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi, en %, 2005 | | 18,8 | 21,7 | 3 sur 15 | 15,5 | 26,5 | 17,6 | 93,4 % |
| Proportion de la population percevant sa vie comme stressante ou extrêmement stressante, en %, 2010 | | 25,4 | 26,7 | 8 sur 15 | 19,4 | 31,3 | 20,1 | 79,0 % |
| Proportion de la population ayant consommé de la drogue, en %, 2008 | | 11,4 | 13,1 | 3 sur 15 | 9,5 | 15,4 | 10,3 | 90,6 % |
| Taux de consommation abusive d'alcool, en %, 2010 | | 18,8 | 17,7 | 9 sur 15 | 12,4 | 30,8 | 13,2 | 70,4 % |
| Proportion de la population satisfaite ou très satisfaite à l'égard de la vie, en %, 2010 | | 94,6 | 93,9 | 6 sur 15 | 91,5 | 96,8 | 96,1 | 98,5 % |
| Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique, en %, 2007-2008 | | 22,0 | 20,0 | 13 sur 15 | 14,2 | 23,8 | 16,0 | 72,9 % |
| Proportion de la population ayant songé au suicide, en %, 2008 | | 2,7 | 2,8 | 7 sur 15 | 2,0 | 3,4 | 2,3 | 84,0 % |
| | | | | | | | | |
| Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants, 2005-2007 | Efficacité | 19,1 | 15,3 | 10 sur 15 | 10,7 | 24,3 | 11,9 | 62,1 % |
| Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans, 2005-2007 | | 580 | 495 | 8 sur 15 | 309 | 826 | 370 | 63,8 % |
| Taux ajusté d'hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée, pour 100 000 habitants, 2009-2010 | | 92 | 61 | 10 sur 15 | 27 | 157 | 57 | 62,0 % |

* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca).

** Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

*** La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

TABLEAU R2 DÉTAILLÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : ADAPTATION

| INDICATEURS* | | CHAUDIÈRE-APPALACHES | ENSEMBLE DU QUÉBEC | RANG** | ÉTENDUE | | BALISE*** | % D'ATTEINTE DE LA BALISE |
|--|---|----------------------|--------------------|-----------|---------|-------|-----------|---------------------------|
| | | | | | MIN | MAX | | |
| Dépenses pour le programme de santé mentale par habitant, en \$, 2009-2010 | | 113 | 137 | 10 sur 15 | 68 | 211 | 193 | 58,5 % |
| Dépenses consacrées aux organismes communautaires, en % du total des dépenses pour le programme de santé mentale, 2009-2010 | Capacités financières | 9,2 | 8,8 | 8 sur 15 | 5,5 | 14,5 | 13,6 | 68,2 % |
| Dépenses pour le programme de santé mentale, en % du total des dépenses pour l'ensemble des programmes-services, 2009-2010 | | 8,0 | 8,0 | 5 sur 15 | 5,4 | 9,3 | 9,1 | 87,6 % |
| | | | | | | | | |
| Nombre de psychiatres (rémunérés à l'acte, en ETC), pour 100 000 habitants, 2009 | Capacités humaines et matérielles | 11,2 | 12,7 | 7 sur 15 | 3,8 | 19,3 | 18,4 | 61,0 % |
| Nombre de psychologues, pour 100 000 habitants, 2010-2011 | | 69,5 | 107,8 | 10 sur 15 | 53,8 | 165,6 | 145,8 | 47,7 % |
| Nombre d'intervenants de première ligne dans les équipes de santé mentale en CSSS (en ETC), pour 100 000 habitants, 2009-2010 | | 14,0 | 13,8 | 9 sur 15 | 8,6 | 25,4 | 22,9 | 61,3 % |
| Nombre d'infirmières pratiquant dans le secteur de la santé mentale, pour 100 000 habitants, 2010-2011 | | 39,2 | 52,5 | 8 sur 15 | 18,2 | 95,5 | 77,2 | 50,8 % |
| Nombre de places destinées aux adultes ayant un diagnostic psychiatrique, au sein des CHSLD publics et privés conventionnés, pour 100 000 habitants, 2009-2010 | | 12,4 | 9,2 | 3 sur 15 | 0,0 | 37,9 | 23,3 | 53,2 % |
| Nombre de places au sein des ressources intermédiaires destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010 | | 8,7 | 34,2 | 14 sur 15 | 4,1 | 68,6 | 35,2 | 24,6 % |
| Nombre de places au sein des ressources de type familial destinées aux individus atteints de troubles mentaux, pour 100 000 habitants, au 31 mars 2010 | | 70,4 | 46,4 | 4 sur 15 | 7,4 | 100,9 | 60,4 | 100,0 % |
| Nombre de places en soutien d'intensité variable dans la communauté, pour 100 000 habitants, 2009-2010 | | 167,9 | 74,3 | 2 sur 15 | 24,3 | 205,0 | 102,6 | 100,0 % |
| Nombre de places en suivi intensif dans le milieu, pour 100 000 habitants, 2009-2010 | | 28,9 | 24,9 | 6 sur 15 | 0,0 | 81,5 | 34,7 | 83,4 % |
| Proportion des interventions en santé mentale, en % du total des interventions en CLSC, 2010-2011 | | 8,9 | 6,2 | - | 3,0 | 11,4 | - | - |
| | | | | | | | | |
| Taux de rétention de la clientèle pour les hospitalisations en psychiatrie, en %, 2009-2010 | Ajustement aux besoins de la population | 95,5 | - | 8 sur 15 | 50,8 | 98,6 | 98,3 | 97,1 % |
| Indice d'autosuffisance en psychiatrie, 2009 | | 0,9 | 1,0 | 9 sur 15 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | 81,1 % |

* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca).

** Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

*** La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION

| INDICATEURS* | CHAUDIÈRE-APPALACHES | ENSEMBLE DU QUÉBEC | RANG** | ÉTENDUE | | BALISE*** | % D'ATTEINTE DE LA BALISE |
|--|----------------------|--------------------|-----------|---------|------|-----------|---------------------------|
| | | | | MIN | MAX | | |
| Proportion de la population ayant utilisé au moins une ressource à des fins de santé mentale, en %, 2003 | 4,9 | 7,5 | 15 sur 15 | 4,9 | 8,7 | 8,5 | 57,6 % |
| Proportion de la population ayant consulté un psychologue au sujet de sa santé mentale, en %, 2003 | 2,3 | 3,8 | 14 sur 15 | 2,0 | 4,8 | 4,6 | 50,0 % |
| Proportion de la population ayant vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de sa santé mentale, en %, 2003-2004 | 5,3 | 8,1 | 14 sur 15 | 5,3 | 9,4 | 9,3 | 57,2 % |
| Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009 | 4,2 | 3,3 | 11 sur 15 | 2,3 | 5,8 | 2,6 | 62,4 % |
| Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009 | 7,4 | 9,6 | 2 sur 15 | 6,4 | 19,2 | 7,3 | 97,7 % |
| Proportion des individus atteints de troubles mentaux se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009 | 76,5 | 73,2 | 4 sur 15 | 59,9 | 78,3 | 77,0 | 99,4 % |
| Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009 | 7,3 | 4,1 | 15 sur 15 | 3,1 | 7,3 | 3,4 | 46,6 % |
| Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009 | 9,1 | 10,3 | 2 sur 15 | 7,5 | 23,8 | 8,6 | 94,4 % |
| Proportion des individus atteints de troubles anxio-dépressifs se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009 | 80,2 | 79,3 | 7 sur 15 | 64,9 | 83,4 | 82,9 | 96,7 % |
| Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le premier profil d'utilisation (hospitalisation), en %, 2009 | 35,4 | 27,2 | 12 sur 15 | 20,0 | 45,0 | 25,8 | 72,8 % |
| Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le second profil d'utilisation (urgence), en %, 2009 | 10,2 | 12,0 | 2 sur 15 | 7,1 | 16,9 | 9,3 | 91,1 % |
| Proportion des individus atteints de troubles schizophréniques se trouvant dans le troisième ou le quatrième profil d'utilisation (psychiatre ou omnipraticien en externe), en %, 2009 | 53,1 | 55,5 | 6 sur 15 | 40,3 | 69,1 | 60,8 | 87,3 % |

Accessibilité

TABLEAU R3 DÉTAILLÉ - CHAUDIÈRE-APPALACHES
TABLEAU DE BALISAGE INTERRÉGIONAL : PRODUCTION (SUITE)

| INDICATEURS* | CHAUDIÈRE-APPALACHES | ENSEMBLE DU QUÉBEC | RANG** | ÉTENDUE | | BALISE*** | % D'ATTEINTE DE LA BALISE |
|--|----------------------|--------------------|-----------|---------|------|-----------|---------------------------|
| | | | | MIN | MAX | | |
| Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antidépresseurs, en %, 2009 | 15,5 | 14,4 | 9 sur 15 | 11,4 | 18,2 | 17,9 | 86,6 % |
| Proportion de la population assurée au régime public d'assurance médicaments du Québec ayant fait usage d'antipsychotiques, en %, 2006 | 4,9 | 4,4 | 5 sur 15 | 3,3 | 5,3 | 5,2 | 94,9 % |
| Proportion d'usagers dont le délai d'accès aux services de deuxième ou de troisième ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours, en %, 2009-2010 | 0,6 | 4,0 | 3 sur 15 | 0,3 | 15,7 | 2,1 | 100,0 % |
| Délai moyen d'attente de l'usager pour une première intervention (évaluation ou action) en santé mentale, en jours, 2010-2011 | 35,0 | 36,0 | 7 sur 15 | 14,2 | 55,1 | 32,8 | 93,7 % |
| Proportion des séjours de 12 heures et plus sur civière à l'urgence pour des raisons de santé mentale, en %, 2010-2011 | 48,3 | 52,8 | 6 sur 15 | 19,0 | 72,4 | 36,8 | 76,3 % |
| Usagers de moins de 18 ans ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010 | 0,4 | 0,5 | 12 sur 15 | 0,2 | 2,9 | 1,1 | 34,3 % |
| Usagers de 18 ans et plus ayant reçu des services de santé mentale de première ligne (mission CLSC) par rapport aux usagers ayant reçu des services spécialisés, ratio, 2009-2010 | 0,5 | 0,4 | 9 sur 15 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 53,4 % |
| | | | | | | | |
| Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux généraux, en jours, 2009-2010 | 16,7 | 23,8 | 3 sur 15 | 14,2 | 36,3 | 15,8 | 94,4 % |
| Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, en jours, 2009-2010 | - | 51,9 | - | 22,9 | 76,7 | - | - |
| | | | | | | | |
| Nombre d'interventions par usager des services de santé mentale en CLSC, 2010-2011 | 13,8 | 9,2 | 3 sur 15 | 5,9 | 15,0 | 14,5 | 95,2 % |
| Proportion des patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, en %, 2008-2009 | 13,3 | 10,2 | 13 sur 15 | 6,5 | 13,4 | 7,6 | 57,1 % |
| Taux de réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale, en %, 2010-2011 | 11,9 | 11,2 | 9 sur 15 | 7,9 | 13,5 | 8,4 | 70,6 % |

* Pour chacun des indicateurs, les définitions, les sources utilisées et les paramètres du calcul de la balise d'excellence sont disponibles dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca).

** Le nombre de régions incluses varie uniquement en fonction de la disponibilité des données.

*** La balise correspond à la moyenne des trois meilleurs résultats, sauf exception.